



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**  
**ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου  
Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο

Τηλ.: 2752026241

Πληροφορίες: Γ. Μητσόπουλος

Αρ. Δελτίου 4 /14-2-22

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ**

**Γενικές αρχές κλαδέματος:**

1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό .
2. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.
3. Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).
4. Απομάκρυνση των κλαδιών από τον οπωρώνα (αποτελούν εστίες μόλυνσης).

**Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς**



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65

**Βλαστικά στάδια Ροδακινιάς**



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65

**1 . ΜΟΝΙΛΙΑ**

**Οδηγίες:**

**Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.**

**Βροχερός, νεφοσκεπής καιρός και θερμοκρασίες πάνω από 5° C, είναι κατ' εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων**

**Διαπιστώσεις:**

**Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδια ευπρόσβλητα από την ασθένεια και πρέπει να είναι προστατευμένες καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης.**

## **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ**

### **2. ΕΞΩΑΣΚΟΣ**

**Οδηγίες:** Ο μύκητας δεν αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες κάτω από 7°C. Στους οπωρώνες που δεν έγινε επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα το φθινόπωρο, να γίνει επιμελημένος ψεκασμός (θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10°C), επιλέγοντας το κατάλληλο εγκεκριμένο σκεύασμα.

### **3. ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ-ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ**

**Οδηγίες-** Ελέγχετε την βάση 100 βλαστών με ξύλο ενός και δύο ετών για ύπαρξη ασπιδίων κοκκοειδών (παρουσία τους στο 20-24% των βλαστών) και αυγών τετρανύχων (χειμερινά αυγά). Για να είναι αποτελεσματική η επέμβαση, πρέπει να λούζεται καλά ολόκληρο το δένδρο (και ο κορμός).

**Ο ψεκασμός αυτός βοηθά στην καταπολέμηση και άλλων εντόμων (ανάρσια, φυλλοδέτης κλπ)**

**Φυτοπ/κά προϊόντα :**

Χειμερινός πολτός (στο λήθαργο) και θερινός πολτός.

Η εφαρμογή του πολτού να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4° C και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.

**Σημειώσεις:**

- Να διαβάζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να τηρείτε αυστηρά το χρόνο ανάμεσα στην τελευταία επέμβαση και την συγκομιδή.
- Χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εκλεκτική δράση για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων.
- Τα δελτία μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)
- Όσοι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ηλεκτρονικά μπορούν να το δηλώσουν στην Υπηρεσία μας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α.**

**ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**